

Procedure vedrørende: Subkutan kanyle – Medicinering i fastliggende subkutan kanyle	
Målgruppe	Sygeplejersker samt social og sundhedsassistenter
Formål	Sikker medicinadministration
Mål	At medicinen gives korrekt
Procedure	<p>Medikamenter til subkutan injektion skal være lægeordineret.</p> <p>Der må max. gives 4 ml. medicin pr. injektion. Større doser kan give ødem af underhuden og medicin optages for langsomt. Er der behov for større dosis fordeles medicin i flere s.c. kanyler, f.eks. kan man give max 8 ml, hvis man fordeler i 2 kanyler. Altid tilstedeværelse af sygeplejerske ved første medicingivning subkutant.</p> <p>Ved medicin omregning, skal man altid være to, hvoraf den ene skal være en sygeplejerske. Omregningen dokumenteres i bemærkningsfeltet på medicinskemaet, f.eks. 5 mg stesolid = 1 ml</p> <p><u>Sådan gives injektioner:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gør medikamina klar i sprøjten. 2. Skru proppen af slangen på den subcutane kanyle. 3. Injicér langsomt medikamina. 4. Ny prop skrues på slangen igen. <p>Hvis inj. mængden er over 0,5 ml er det ikke nødvendigt at efterskylle. Hvis inj. mængden er under 0,5 ml efterskylles med inj. Nacl isot. 0,1 ml, (idet der er 0,1 ml i slangen.) Inj. Nacl bestilles via egen læge.</p> <p><u>Medikamina der kan gives i den subkutane nål:</u></p> <p>Morfin Solumedrol Furix Primperan Serenase Buscopan Nozinan Robinul</p>

