

Instruks for prøvetagning ved udredning for MRSA (*Methicillin resistente Staphylococcus aureus*) hos personer på plejehjem og lignende institutioner


Materialer til prøvetagning:

- Podepinde og prøveglas (eSwab).
- Blå prøvesedler.
- Evt. urinprøvesæt Monovette.
- Evt. ekspektorat æsker.

Materialet rekvireres på Klinisk Mikrobiologisk Afdelings hjemmeside ved at følge dette link:
<https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/Klinisk-Mikrobiologisk-Afdeling/Raadgivning-og-praktisk-information/Documents/Bestillingsseddel.pdf>

Procedure for håndtering af podepind og prøveglas (eSwab):

- "Børsten" på podepinden må ikke berøres.
- Efter podning placeres podepinden forsigtigt i prøveglasset – uden at ramme ydersiden eller kanten af prøveglasset.
- Væsken i prøveglasset må ikke hældes ud – det er et transportmedie.
- Podepinden føres helt ned i bunden af prøveglasset inden podepinden knækkes over prøveglassets kant. Herefter sættes låget på.



Der skal som minimum podes fra næse, svælg og perineum. Hvis personen har sår, eksem, fremmedlegemer eller tegn på infektion fra andre lokalisationer, skal der suppleres med podninger herfra.

Procedure for prøvetagning:

Podning fra næse (én podepind)

- Podepinden føres med et fast tryk rundt et par gange på indersiden af næsefløjen – max. 1 cm op i næsen.
- Der podes fra begge næsebor med samme podepind.

Podning fra svælg (én podepind)

- Podepinden føres ned til først den ene tonsil og derefter den anden tonsil med samme podepind. Podepinden føres med et fast tryk rundt på tonsillerne – kan hos nogle personer virke ubehageligt og udløse brækreflekser.

Podning fra perineum

- Podepinden føres med et fast tryk på langs og tværs rundt på huden mellem genitalia externa og anus.

Podning fra sår, eksem, pus, ekspektorat, urin, stomi og/eller fremmedlegemer

- Ved sår føres podepinden ind under sårskorpens kant, eller sårskorpen løftes af, og der podes fra sårbunden. Der anvendes én podepind til hvert sår.
- Ved eksem podes fra den afficerede hud – også selv om der ikke aktuelt er infektion. Der anvendes én podepind.
- Hvis der er pus i sår, øje, eller øre tages en prøve heraf. Der anvendes en podepind pr. lokalisation.
- Ved fremmedlegemer (f.eks. dræn, sonde og katetre) podes fra indstiksstedet.
- Hvis der er en stomi, skal der tages en prøve fra hudkanten af stoma.
- Hvis der er symptomer på pneumoni eller produktiv hoste, skal der tages et ekspektorat, der opsamles i opsamlingsboks med gult skruelåg.
- Hvis der er symptomer på urinvejsinfektion eller der ligger et urinvejskateter, skal der tages en urinprøve, der opsamles i Monovette prøveglas.

Udfyldelse af blå prøveseddel

- Der skal udfyldes én prøveseddel pr. prøveglas.
- Label fra prøveseddel skal sættes på langs af prøveglasset.

Prøvesedlen udfyldes med:

1. Den praktiserende læges **ydernummer** samt navn og evt. adresse.
2. Kliniske oplysninger fx MRSA screening i forbindelse med smitteopsporing, udbrud eller kontrolpodning.
3. Husk at skrive, hvis personen er i antibiotisk behandling og med hvilket præparat.
4. Patientnavn, **cpr. nummer**, prøvedato og adressen på den institution/afdeling, hvor prøven er taget.
5. MRSA – NB: Kun et kryds pr. prøveseddel.
6. Hvis afkrydsningsfeltet ”*andet*” benyttes skal ”*andet*” i det blanke felt ovenover udfyldes med lokalitet.

1. Praktiserende læges ydernr., navn og adresse.

Label fra prøveseddel skal sættes på langs af prøveglasset.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445
Kettegaard Allé 30
2650 Hvidovre
Telefon 3862 2429 (8.00-15.30) Fax 3862 3357
Internet: www.hvidovre-hospital.dk/nh-ama
E-mail: kliniskmikrobiologi@hv.regionh.dk

Labels påsættes på langs af prøveglasset

9 272 62 38. 9 272 62 38. 9 272 62 38.
9 272 62 38. 9 272 62 38. KUN EN UNDER-
SØGELSE PR. SEDDEL

Kopievar til: Navn: Ydernr.:
Kliniske oplysninger - skal udfyldes!
Diagnose/indikation for undersøgelse:
Antibiotika Nej Ja Hvilket:
Prøvedato:
Patient navn:
Adresse:
CPR nr.:

Gonokokker Cervix Urethra Rectum Svælg Øje

Vaginalpodn. D+R Gær Trichomonas

Urin D+R Cystitis Recidiverende cystitis
 KAD Gravid Pyelonefritis

Ekspektorat D+R TB-mik Pneumoni KOL
Ledvæske D+R Fra:
Podninger Næse Øre h/v Cicatrice
 Svælg Sår Abaces
 Bihule Decubitus Østet
 Øje h/v Hud Perineum
Andet: Rectum

MRSA Næse Svælg Perineum Sår Andet:

Fæcesundersøgelser
 Udlandsrejse, hvor
Patogene tarmbakterier Diaré erhvervet i DK
 Rejse diaré
 Blodig diaré
 Diaré hos børn (<7 år)

Parasitter i fæces
 Orm + æg + cyster
 Borneormeæg / analftryk
Virus i fæces
 Rotav- og adenovirus

Andet:
 Enterikelbiopsi / Helicobacter pylori

5. Kun et kryds pr. seddel.

6. Hvis feltet **andet** afkryd-
ses, skal feltet **andet** oven-
over også udfyldes med det
aktuelle prøvemateriale, der
kan være urin, ekspektorat,
stomi eller lign.

2. Kliniske oplysninger kan være
screening ifm. smitteopsporing
eller smitteudbrud.

3. Husk at skrive, hvis personen får
antibiotika og hvilket præparat.

4. Prøvedato, patientnavn, institutionens
navn og patientens CPR nr.

Opbevaring af prøver

Prøverne opbevares på køl indtil forsendelse.

Forsendelse af prøver

- Prøver kan afleveres på opsamlingssteder i kommunen, jf. skrivelse udsendt til alle plejehjem/institutionsledelser d. 2/10-17.
For oplysninger om opsamlingsstederne, som indgår i Regionens kørselsordning, kontakt Region Hovedstaden - Enhed for Logistik & Forsyning tlf. **38 66 69 00**.
- Alternativt med post til:
Hvidovre Hospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445,
Kettegaard Allé 30, 2650 Hvidovre.